



DCAD-7000  
Вкусно  
Эффективно  
Выгодно

Профилактика молочной лихорадки / послеродового пареза и сопутствующих нарушений в новотельном периоде.

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уникальность – доступное и эффективное предложение – выгоднее, чем «защищенные кислые соли» по цене при сохранении привлекательности и потребления животными, в отличие от обычных кислых солей.

Сочетает в себе положительные качества обоих классов продуктов на рынке.

Эффективность - доказана широким опытом применения данного типа составов на территории нашей страны и во многих странах мира.

Легко проверяется общеизвестным способом - по pH мочи животных.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает молочную лихорадку / послеродовый парез, гипокальциемию
- Предотвращает все связанные с гипокальциемией болезни
- Стимулирует усвоение, мобилизацию кальция и его реабсорбцию
- Сохраняет здоровье и жизнь
- Повышает молочную продуктивность
- Хорошо потребляется в отличие от множества конкурентных продуктов
- Дешевле многих конкурентных продуктов

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для коров перед отелом для предотвращения после отела проблем с низким уровнем кальция (гипокальциемией), клиническими проявлениями - молочной лихорадкой / послеродовым парезом и другими сопутствующими заболеваниями.

Используется как профилактическая добавка в транзитный период (21 день до отела) АниКАН вводится в полностью смешанный рацион, в частично смешанный рацион, в кормосмесь или комбикорм. Рекомендуемое количество: 150-300 г/голову/в день. Для поднятия дозировки нужна консультация специалиста и (или) контроль pH Эффективен в рационах, содержащих бобовые культуры и высокий уровень кальция.

ДКАД (DCAD) -7000/кг

## ГИПОКАЛЬЦИЕМИЯ, МОЛОЧНАЯ ЛИХОРАДКА, ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПАРЕЗ.

Все три понятия обозначают проблемы с уровнем кальция в крови у коров.

Гипокальциемия – уровень кальция ниже нормы, т.е. ниже 8.5 мг/дл

Молочная лихорадка или послеродовый парез - клинические проявления недостаточности кальция (показатель опускается ниже 7.5 мг/дл).

Субклинических случаев намного больше, но они намного менее заметны. Обычными проявлениями являются/ слабость, скованность, низкая активность, снижение общего тонуса, падение потребления корма.

Клинические проявления обычно имеют нервную симптоматику. Отсутствие своевременной помощи или некавалифицированная помощь животным часто смертельны. Исследования указывают на тесную связь данного заболевания с большинством послеродовых заболеваний:

- кетозом
- жировой дистрофией печени
- смещением сычуга
- атониями пищеварительного тракта
- метритами
- маститами

- ! Заболеванию подвержены до 50% всех коров начиная со второй лактации.
- В среднем каждый клинический случай обходится предприятию до 14000 рублей.

pH мочи контроль



pH мочи АниКАН



АниКАН решает проблемы обмена кальция у коров и повышения количества и рентабельности производства молока с самых первых дней лактации.